



## #1 Recetado Inhibidor del receptor de andrógenos (IRA)

\*Un tipo de medicamento para el cáncer de próstata que disminuye la frecuencia con que los andrógenos, como la testosterona, se unen a un receptor de andrógenos.

Fuente: Datos de mercado de IQVIA del volumen de recetas totales para CPRC y CPSCm de todos los medicamentos de marca contra el cáncer de próstata, enero-julio de 2023

ESTA INFORMACIÓN NO IMPLICA LA SEGURIDAD O EFICACIA DE NINGÚN PRODUCTO. NO DEBERÍAN HACERSE COMPARACIONES.

**Información  
para ayudarle a  
comenzar a tomar XTANDI**

**¿Qué es XTANDI?** XTANDI es un medicamento recetado que se usa para tratar a los hombres con un cáncer de próstata que:

- ya no responde a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona, o
- se ha diseminado a otras partes del cuerpo y responde a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona, o
- no se ha diseminado a otras partes del cuerpo y responde a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona, y quienes corren un riesgo elevado de que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo

Se desconoce si XTANDI es seguro y eficaz para su uso en mujeres o niños.

### **Información de Seguridad Seleccionada**

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos convulsiones.**

Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de sufrir una convulsión. Evite actividades en las que una pérdida de conciencia repentina pueda provocar daños graves a usted o a otra persona. Informe a su médico de inmediato si pierde la conciencia o tiene una convulsión.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa](#) de XTANDI.



# SU EXPERIENCIA CON XTANDI COMIENZA AQUÍ

## Tabla de contenidos

Acerca de XTANDI .....3

Comprender el cáncer de próstata avanzado .....4

Cuatro tipos de cáncer de próstata avanzado .....5

Cómo puede ayudarle XTANDI .....6

Cómo funciona XTANDI .....14

Tomar XTANDI .....15

Recomendaciones para mantenerse por buen camino .....16

Tener una rutina saludable .....18

Recomendaciones que pueden ayudarle a manejar los efectos secundarios .....20

Mantener una comunicación abierta .....22

Indicaciones e información importante de seguridad .....25

Cómo obtener XTANDI .....33

XTANDI Support Solutions® .....36

Preguntas para su próxima cita .....38



**XTANDI Support Solutions® ayuda a los pacientes que reúnen los requisitos a encontrar formas de pagar por el tratamiento de XTANDI**

**Nuestros dedicados especialistas en acceso están aquí para ayudarle. Llame al 1-855-8XTANDI (1-855-898-2634).**

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la Información para el Paciente y a la Información de Prescripción Completa de XTANDI.



# ACERCA DE XTANDI

---

- Comprender el cáncer de próstata avanzado
- Cuatro tipos de cáncer de próstata avanzado
- Cómo puede ayudarle XTANDI
- Cómo funciona XTANDI
- Tomar XTANDI
- Recomendaciones para mantenerse por buen camino
- Tener una rutina saludable
- Recomendaciones que pueden ayudarle a manejar los efectos secundarios
- Mantener una comunicación abierta

# COMPRENDER EL CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO

## Cuando el cáncer de próstata está avanzado puede tratarse, pero no curarse

A diferencia de la etapa temprana del cáncer de próstata, que a veces puede curarse con tratamiento, el cáncer de próstata avanzado no puede curarse.

**Pero la buena noticia es que es posible que su médico tenga formas de ayudar a controlar el cáncer con el tiempo, y una de esas formas puede ser XTANDI.**

Lea la página siguiente para conocer los cuatro tipos de cáncer de próstata avanzado que se pueden tratar con XTANDI. Consulte a su médico si XTANDI es adecuado para su tipo de cáncer de próstata avanzado.

## Su médico puede decirle si el cáncer está empeorando o si se está diseminando

Analizará algunos indicadores tales como:

- **Su nivel de antígeno prostático específico (PSA).** ¿Qué tan rápido se está elevando?
- **Sus estudios por imágenes.** ¿Se observan tumores que aumentan de tamaño o tumores nuevos formándose?

En las páginas 5-11, vea cómo XTANDI ayudó con cuatro tipos de cáncer de próstata avanzado en estudios clínicos.

## Información de Seguridad Seleccionada

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos el Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES).** Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de contraer una enfermedad que afecta al cerebro llamada PRES. Informe a su médico de inmediato si tiene una convulsión o síntomas que empeoran con rapidez como dolor de cabeza, disminución del estado de alerta, confusión, visión reducida, visión borrosa u otros problemas visuales. Su médico le hará una prueba para comprobar si tiene PRES.


Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).



# CUATRO TIPOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO


## ¿Qué tipo de cáncer de próstata avanzado tiene?

XTANDI está aprobado por la FDA para tratar estos tipos de cáncer de próstata avanzado.




### **Cáncer de próstata metastásico sensible a la castración (CPSCm)**

- El cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo
- El cáncer responde a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona




### **Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm)**

- El cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo
- El cáncer ya no responde a la terapia hormonal ni al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona



### **Cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración (CPRCnm)**

- El cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo
- El cáncer ya no responde a la terapia hormonal ni al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona



### **Cáncer de próstata no metastásico sensible a la castración (CPSCnm) con riesgo elevado de diseminación del cáncer**

- El cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo
- El cáncer responde a la terapia hormonal para reducir la testosterona
- Existe un riesgo elevado de que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo

**Pida más información a su médico con respecto a su tipo de cáncer de próstata avanzado.**

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa](#) de XTANDI.

# CÓMO PUEDE AYUDARLE XTANDI



## XTANDI en el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración (CPSCm)

### XTANDI se estudió en hombres con un cáncer de próstata avanzado que:

- Aún respondía a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona
- **Se había diseminado** a otras partes del cuerpo

Este estudio incluyó 1,150 hombres. En él se compararon 574 hombres que tomaban XTANDI con 576 hombres que no tomaban XTANDI.

**Todos los hombres se sometieron a una cirugía para reducir la testosterona o continuaron tomando terapia hormonal durante el estudio.**

### En este estudio de CPSCm:

### XTANDI ralentizó la progresión del cáncer de próstata avanzado

**61%**  
MENOR  
PROBABILIDAD

- Los hombres que tomaban XTANDI tuvieron una probabilidad 61% menor de que el cáncer progresara en comparación con los hombres que no tomaban XTANDI durante el estudio. Se observó progresión en 89 (15.5%) hombres con XTANDI + ADT\* y en 198 (34.4%) hombres con ADT sola.
  - La mediana<sup>†</sup> del lapso de tiempo hasta que el cáncer empeoró<sup>‡</sup> no se alcanzó al combinar XTANDI + ADT en comparación con 19 meses con ADT sola
- La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, medido según estudios por imágenes, o si el paciente falleció por cualquier motivo

### Información de Seguridad Seleccionada

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos reacciones alérgicas.** Algunas personas que toman XTANDI tuvieron reacciones alérgicas. Deje de tomar XTANDI y busque atención médica de inmediato si presenta inflamación en la cara, la lengua, los labios o la garganta.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# CÓMO PUEDE AYUDARLE XTANDI (continuación)

## En este mismo estudio en hombres con CPSCm: XTANDI ayudó a que los hombres vivieran más tiempo (Supervivencia general)



- XTANDI mejoró considerablemente la supervivencia general<sup>§</sup> en un 34% en comparación con ADT sola. Hubo 154 (26.8%) fallecimientos con XTANDI + ADT en comparación con 202 (35.1%) fallecimientos con ADT sola.
  - No se alcanzó la mediana del lapso de tiempo que vivieron los pacientes después de comenzar el tratamiento

## Además, los pacientes que recibieron XTANDI tuvieron una mejoría del 72% en el retraso del tiempo antes de recibir el siguiente tratamiento para el cáncer, incluida la quimioterapia.

Los resultados individuales pueden variar.

\*ADT=Terapia de Privación de Andrógenos.

†La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

‡El lapso de tiempo desde el comienzo del tratamiento para el cáncer hasta que el cáncer empeoró, medido según estudios por imágenes, o si el paciente falleció por cualquier motivo.

§El promedio del lapso de tiempo que los pacientes siguen con vida después del comienzo del tratamiento.

Los resultados pueden variar. Hable con su médico sobre lo que esto puede significar para usted.

## Información de Seguridad Seleccionada

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos enfermedad cardíaca.** Hubo casos de obstrucción de las arterias del corazón (cardiopatía isquémica) que provocaron la muerte de algunas personas durante el tratamiento con XTANDI. Su médico le monitoreará para ver si tiene signos y síntomas de problemas cardíacos durante su tratamiento. Llame a su médico o vaya a una sala de emergencias de inmediato si siente dolor de pecho o malestar en estado de reposo o al realizar actividad física, o si siente una dificultad respiratoria durante el tratamiento con XTANDI.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).





# CÓMO PUEDE AYUDARLE XTANDI (continuación)



## XTANDI en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm)

### XTANDI se estudió en hombres con un cáncer de próstata avanzado que:

- Ya no respondía a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona
- **Se había diseminado** a otras partes del cuerpo

Este estudio incluyó 1,717 hombres. En él se compararon 872 hombres que tomaban XTANDI con 845 hombres que no tomaban XTANDI.

Estos hombres no habían recibido quimioterapia. **Todos los hombres se sometieron a una cirugía para reducir la testosterona o continuaron con la terapia hormonal durante el estudio.**

### En este estudio de CPRCm:

### XTANDI ralentizó la progresión del cáncer de próstata avanzado



- Los hombres que tomaban XTANDI tuvieron una probabilidad 83% menor de que el cáncer progresara en comparación con los hombres que no tomaban XTANDI durante el estudio. Se observó progresión en 118 (14%) hombres con XTANDI + ADT\* y en 320 (40%) hombres con ADT sola.
  - La mediana<sup>†</sup> del lapso de tiempo hasta que el cáncer empeoró<sup>‡</sup> no se alcanzó al combinar XTANDI + ADT en comparación con 4 meses con ADT sola
- La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, medido según estudios por imágenes, o si el paciente falleció por cualquier motivo

Vea más resultados del estudio en la página siguiente.

\*ADT=Terapia de Privación de Andrógenos.

†La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

‡El lapso de tiempo desde el comienzo del tratamiento para el cáncer hasta que el cáncer empeoró, medido según estudios por imágenes, o si el paciente falleció por cualquier motivo.

Los resultados pueden variar. Hable con su médico sobre lo que esto puede significar para usted.

### Información de Seguridad Seleccionada

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos convulsiones.** Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de sufrir una convulsión. Evite actividades en las que una pérdida de conciencia repentina pueda provocar daños graves a usted o a otra persona. Informe a su médico de inmediato si pierde la conciencia o tiene una convulsión.

**Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).**





# CÓMO PUEDE AYUDARLE XTANDI (continuación)

## En este mismo estudio en hombres con CPRCm:

### XTANDI ayudó a que los hombres vivieran más tiempo (Supervivencia general)

Los hombres que tomaban XTANDI tuvieron una reducción del 23% en el riesgo de fallecimiento en comparación con los hombres que no tomaban XTANDI durante el estudio. Hubo 368 (42%) fallecimientos con XTANDI + ADT en comparación con 416 (49%) fallecimientos con ADT sola.

La mediana de tiempo de supervivencia general<sup>s</sup> fue de 35 meses en el caso de los hombres que tomaban XTANDI + ADT en comparación con 31 meses con ADT sola.

Los siguientes números son la **mediana**. La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

Tomando XTANDI  
(meses)

35

Sin tomar XTANDI  
(meses)

31

### XTANDI retrasó la mediana de tiempo antes de que los hombres empezaran la quimioterapia

Durante el estudio, los hombres que tomaban XTANDI tuvieron una reducción del 65% en el riesgo de comenzar una nueva quimioterapia, y también retrasaron la mediana de tiempo antes de que los hombres comenzaran la quimioterapia: 28 meses en los hombres que tomaban XTANDI en comparación con 11 meses en los hombres que no tomaban XTANDI.

Los siguientes números son la **mediana**. La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

Tomando XTANDI  
(meses)

28

Sin tomar XTANDI  
(meses)

11

<sup>s</sup>El lapso de tiempo que los pacientes siguen con vida después del comienzo del tratamiento.

## Información de Seguridad Seleccionada

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos enfermedad cardíaca.** Hubo casos de obstrucción de las arterias del corazón (cardiopatía isquémica) que provocaron la muerte de algunas personas durante el tratamiento con XTANDI. Su médico le monitoreará para ver si tiene signos y síntomas de problemas cardíacos durante su tratamiento. Llame a su médico o vaya a una sala de emergencias de inmediato si siente dolor de pecho o malestar en estado de reposo o al realizar actividad física, o si siente una dificultad respiratoria durante el tratamiento con XTANDI.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# CÓMO PUEDE AYUDARLE XTANDI (continuación)



## XTANDI en el cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración (CPRCnm)

### XTANDI se estudió en hombres con un cáncer de próstata avanzado que:

- Ya no respondía a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona
- **No se había diseminado** a otras partes del cuerpo


Este estudio incluyó 1,401 hombres. En él se compararon 933 hombres que tomaban XTANDI con 468 hombres que no tomaban XTANDI.

Estos hombres no habían recibido quimioterapia. **Todos los hombres se sometieron a una cirugía para reducir la testosterona o continuaron con la terapia hormonal durante el estudio.**

Vea los resultados del estudio en la página siguiente.

### En este estudio en hombres con CPRCnm:

### XTANDI ralentizó la diseminación del cáncer de próstata avanzado



- Los hombres que tomaban XTANDI tuvieron una probabilidad 71% menor de que el cáncer se diseminara en comparación con los hombres que no tomaban XTANDI durante el estudio. Se observó diseminación en 219 (23.5%) hombres que tomaron XTANDI + ADT\* y en 228 (48.7%) hombres que recibieron ADT sola
  - La mediana<sup>†</sup> del lapso de tiempo hasta que el cáncer se diseminó fue de 37 meses con XTANDI + ADT en comparación con 15 meses con ADT sola
- Se consideró que el cáncer se diseminó según lo medido con estudios por imágenes o si la persona falleció por cualquier motivo

### Información de Seguridad Seleccionada

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos el Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES).** Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de contraer una enfermedad que afecta al cerebro llamada PRES. Informe a su médico de inmediato si tiene una convulsión o síntomas que empeoran con rapidez como dolor de cabeza, disminución del estado de alerta, confusión, visión reducida, visión borrosa u otros problemas visuales. Su médico le hará una prueba para comprobar si tiene PRES.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).



# CÓMO PUEDE AYUDARLE XTANDI (continuación)

## En este mismo estudio en hombres con CPRCnm: XTANDI ayudó a que los hombres vivieran más tiempo (Supervivencia general)

Los hombres que tomaban XTANDI tuvieron una reducción del 27% en el riesgo de fallecimiento en comparación con los hombres que no tomaban XTANDI durante el estudio. Hubo 288 (30.9%) fallecimientos con XTANDI + ADT en comparación con 178 (38%) fallecimientos con ADT sola.

La mediana de supervivencia general<sup>‡</sup> fue de 67 meses en el caso de los hombres que tomaban XTANDI en comparación con 56 meses con ADT sola.

Los siguientes números son la **mediana**. La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

Tomando XTANDI  
(meses)

67

Sin tomar XTANDI  
(meses)

56

## Además, XTANDI retrasó la mediana de tiempo que transcurrió antes de que los hombres comenzaran su siguiente tratamiento para el cáncer, incluida la quimioterapia.

Durante el estudio, los hombres que tomaban XTANDI tuvieron una reducción del 79% en el riesgo de comenzar su siguiente tratamiento para el cáncer, incluida la quimioterapia. La prolongación de la mediana de tiempo fue de 39 meses en los hombres que tomaban XTANDI en comparación con 17 meses en los hombres que no tomaban XTANDI.

Los siguientes números son la **mediana**. La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

Tomando XTANDI  
(meses)

39

Sin tomar XTANDI  
(meses)

17

\*ADT=Terapia de Privación de Andrógenos.

†La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

‡El promedio del lapso de tiempo que los pacientes siguen con vida después del comienzo del tratamiento.

Los resultados pueden variar. Hable con su médico sobre lo que esto puede significar para usted.

## Información de Seguridad Seleccionada

XTANDI puede generar problemas de fertilidad en los hombres y esto puede afectar la capacidad de engendrar hijos. Hable con su médico si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# CÓMO PUEDE AYUDARLE XTANDI (continuación)



## Cáncer de próstata no metastásico sensible a la castración (CPSCnm) con riesgo elevado de diseminación del cáncer

### XTANDI se estudió en hombres con un cáncer de próstata avanzado:

- Que **no se había diseminado** a otras partes del cuerpo
- Que responde a la terapia hormonal para disminuir la testosterona
- Que tiene un riesgo elevado de diseminarse a otras partes del cuerpo

Este estudio incluyó 1,068 hombres. En él se compararon 355 hombres que tomaban XTANDI + ADT con 355 hombres que tomaban XTANDI solo y con 358 hombres que recibían ADT\* sola.

Estos hombres no habían recibido quimioterapia. **Todos los hombres habían sido sometidos a cirugía y/o a radioterapia para reducir la testosterona.**

Vea los resultados del estudio en la página siguiente.

## Información de Seguridad Seleccionada

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos caídas y fracturas óseas.**

El tratamiento con XTANDI puede aumentar el riesgo de caídas y fracturas óseas. Las caídas no fueron provocadas por pérdida de la conciencia ni convulsiones. Su médico monitoreará su riesgo de caídas y fracturas óseas durante el tratamiento con XTANDI.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# CÓMO PUEDE AYUDARLE XTANDI (continuación)

## En este estudio de CPSCnm con riesgo elevado de diseminación del cáncer: XTANDI + ADT\* ralentizó la diseminación del cáncer de próstata avanzado

**58%**  
MENOR  
PROBABILIDAD

XTANDI + ADT

- Los hombres que tomaban XTANDI + ADT tuvieron una probabilidad 58% menor de que el cáncer se diseminara en comparación con los hombres que recibían ADT sola. Se observó diseminación del cáncer en 45 (13%) hombres con XTANDI + ADT y en 92 (26%) hombres con ADT sola
  - En ninguno de los grupos de tratamiento se alcanzó la mediana<sup>†</sup> del lapso de tiempo transcurrido hasta la diseminación del cáncer<sup>‡</sup>
- Se consideró que el cáncer se diseminó según lo medido con estudios por imágenes o si el paciente falleció por cualquier motivo

## En el mismo estudio en hombres que tenían CPSCnm con riesgo elevado de diseminación del cáncer: El tratamiento solo con XTANDI ralentizó la diseminación del cáncer de próstata avanzado

**37%**  
MENOR  
PROBABILIDAD

XTANDI solo

- Los hombres que solo tomaron XTANDI tuvieron una probabilidad 37% menor de que el cáncer se diseminara en comparación con los hombres que recibieron ADT sola. Se observó diseminación del cáncer en 63 hombres (18%) que recibieron tratamiento solo con XTANDI y en 92 hombres (26%) que recibieron ADT sola.
  - En ninguno de los grupos de tratamiento se alcanzó la mediana del lapso de tiempo transcurrido hasta la diseminación del cáncer
- Se consideró que el cáncer se diseminó según lo medido con estudios por imágenes o si el paciente falleció por cualquier motivo

Este estudio continúa para determinar el efecto en la supervivencia general.

El médico podría recomendar suspender temporalmente el medicamento. Eso significa que usted podría tomar un descanso del tratamiento. El médico determinará la duración de esa suspensión temporal.

\*ADT=Terapia de Privación de Andrógenos, leuprolida.

†La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

‡El lapso de tiempo desde el comienzo del tratamiento para el cáncer hasta que el cáncer empeoró, medido según estudios por imágenes, o si el paciente falleció por cualquier motivo.

Los resultados pueden variar. Hable con su médico sobre lo que esto puede significar para usted.

## Información de Seguridad Seleccionada

**Los efectos secundarios más comunes de XTANDI incluyen:** dolor muscular y articular, mayor sensación de cansancio que la habitual, sofocos, estreñimiento, disminución del apetito, diarrea, presión arterial alta, problemas de sangrado, caídas, fracturas óseas y dolor de cabeza.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# CÓMO FUNCIONA XTANDI


## Cómo funciona XTANDI en las células del cáncer de próstata

XTANDI es un inhibidor de receptores de andrógenos. Los andrógenos son un grupo de hormonas que incluyen la testosterona. Los inhibidores de receptores de andrógenos disminuyen la frecuencia con que los andrógenos, como la testosterona, se unen a un receptor de andrógenos y, por lo tanto, es posible que ralenticen el crecimiento de los tumores y las células del cáncer de próstata.

**Imagine el interior de una célula de cáncer de próstata como un rompecabezas**


### Célula de cáncer de próstata

Cuando el **andrógeno** se conecta con un **receptor de andrógenos**, puede causar el crecimiento de las células tumorales.



### Cómo funciona XTANDI

XTANDI ayuda a disminuir la frecuencia con la que un **andrógeno** puede conectarse con un **receptor de andrógenos**. En consecuencia, XTANDI puede ralentizar el crecimiento de las células cancerosas y dichas células pueden morir.



Este es el funcionamiento de XTANDI que se demostró en los estudios de laboratorio. Se desconoce aún la importancia clínica.

## Información de Seguridad Seleccionada

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos convulsiones.**

Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de sufrir una convulsión. Evite actividades en las que una pérdida de conciencia repentina pueda provocar daños graves a usted o a otra persona. Informe a su médico de inmediato si pierde la conciencia o tiene una convulsión.

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# TOMAR XTANDI

## Tome XTANDI exactamente como se lo indique su médico

Tome su dosis recetada una vez al día, todos los días a la misma hora. Si es necesario, su médico puede modificar la dosis. No cambie ni deje de tomar su dosis recetada de XTANDI sin hablar con su médico.

- **XTANDI puede tomarse con o sin alimentos**
- **Ingiera las cápsulas o comprimidos de XTANDI enteros.** No mastique, disuelva, ni abra las cápsulas. No corte, triture, ni mastique los comprimidos
- **Si está recibiendo una terapia de hormonas liberadoras de gonadotropina (GnRH),** debería continuar con el tratamiento mientras tome XTANDI, a menos que se haya sometido a una cirugía para reducir la testosterona en su cuerpo (castración quirúrgica)

**Si se olvida una dosis,** tome la dosis recetada tan pronto como lo recuerde ese día.

**Si se olvida de tomar la dosis durante todo el día,** tome su dosis normal al día siguiente a su horario normal.

**No tome más que la dosis recetada** de XTANDI cada día.



### Si toma demasiado XTANDI:


- Llame a su médico, o
- Vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato

El riesgo de tener una convulsión puede aumentar si toma demasiado XTANDI.



# RECOMENDACIONES PARA MANTENERSE POR BUEN CAMINO

**Siga estas recomendaciones para siempre tomar el medicamento como le indicó su médico**



Tome XTANDI cuando haga otra actividad cotidiana, como después de cepillarse los dientes.



Ponga una alarma que le recuerde tomar XTANDI a la misma hora todos los días.



Use el rastreador de píldoras que quizás haya recibido con su kit inicial.



**"Mi mejor rutina transcurre por la mañana. Tomo XTANDI después de cepillarme los dientes".**

*-Wayne, paciente en tratamiento con XTANDI*

# RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS ÚTILES PARA FAVORECER SU SALUD COTIDIANA

---

- Tener una rutina saludable
- Recomendaciones para controlar los efectos secundarios que pueda tener
- Mantener una comunicación abierta

# TENER UNA RUTINA SALUDABLE

## Recomendaciones útiles

Es importante que haga lo mejor posible por cuidarse mientras vive con la enfermedad. Hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada puede ayudar. Las siguientes recomendaciones son para pacientes con cáncer en general, pero no se estudiaron con XTANDI. Asegúrese de hablar con su equipo de atención médica antes de decidir si alguna de estas recomendaciones podría ser adecuada para usted.



### Los beneficios de la actividad física

Vivir con su enfermedad no significa que no puede ser una persona activa. La actividad física suave durante el tratamiento para el cáncer se ha relacionado con beneficios físicos y emocionales como los siguientes:

- Mejora la autoestima
- Disminuye el riesgo de sentir ansiedad y depresión
- Atenúa los síntomas de fatiga
- Ayuda a controlar el peso

Cuando se ejercita durante el tratamiento, es importante que escuche a su cuerpo. Asegúrese de hablar con su médico para crear una rutina segura para usted.



### Incorporar la actividad física a su rutina diaria

Le damos algunas ideas simples para que incorpore la actividad física a su rutina diaria.

- Pida a un amigo o familiar que le acompañe
- Salga a montar en bicicleta
- Camine por su vecindario
- Lave su auto
- Rastrille las hojas del jardín
- Use las escaleras
- Trabaje en su jardín

Recuerde hablar con su médico antes de comenzar cualquier rutina de actividad física.

# TENER UNA RUTINA SALUDABLE (continuación)

## Recomendaciones útiles

Es importante que haga lo mejor posible por cuidarse mientras vive con la enfermedad. Hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada puede ayudar. Las siguientes recomendaciones son para pacientes con cáncer en general, pero no se estudiaron con XTANDI. Asegúrese de hablar con su equipo de atención médica antes de decidir si alguna de estas recomendaciones podría ser adecuada para usted.



### Los beneficios de una buena nutrición

La alimentación desempeña un papel esencial en el funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, es importante consumir alimentos saludables y ricos en nutrientes. Una dieta saludable puede ayudarle a:

- Tener más energía
- Mantener un peso saludable

Alimentarse bien puede significar algo distinto para cada persona. Por eso, es importante que colabore con su médico o nutricionista para diseñar un plan que se adapte a sus necesidades.



### Crear una dieta saludable

Obtener los nutrientes adecuados puede ayudarle durante el tratamiento:

- Las proteínas son esenciales para ayudarle a mantener un sistema inmunitario más saludable

**Pruebe: Pescados, aves, frutos secos y mantequillas de frutos secos, o lentejas**

- Los carbohidratos le proporcionan energía a su cuerpo para realizar actividad física

**Pruebe: Cereales integrales (como quinoa o arroz integral), frutas y verduras**

- El agua le ayuda a mantener el cuerpo hidratado

**Pruebe: Beber al menos cuatro vasos de 8 onzas de agua al día para mantenerse hidratado**

**Hable con su médico para elegir el plan que se adapte mejor a sus necesidades.**

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# RECOMENDACIONES QUE PUEDEN AYUDARLE A MANEJAR LOS EFECTOS SECUNDARIOS

## Efectos secundarios más comunes de XTANDI y recomendaciones generales que pueden ayudarle



A continuación, se mencionan los efectos secundarios más comunes que los hombres presentaron mientras tomaban XTANDI en los estudios clínicos. También encontrará información sobre cómo hablar con su médico acerca de cada efecto secundario. Esta información no se ha estudiado con XTANDI.

**Recuerde que la siguiente información no sustituye las indicaciones de su médico. Siempre hable con su equipo de atención médica sobre los efectos secundarios y la información que podría ayudarle a controlarlos.**

### Dolor muscular y articular

Tome notas sobre el dolor que sienta y muéstreselas a su equipo de atención médica. Su médico podría recomendarle fisioterapia o medicamentos para ayudar a reducir la hinchazón y la inflamación. También podría sugerirle que haga estiramientos ligeros y se aplique compresas calientes o frías para ayudar a reducir el dolor.

### Mayor sensación de cansancio que la habitual

Hable con su médico si se siente fatigado. Podría recomendarle hacer ejercicio u otras actividades diarias que puedan ayudar a reducir el agotamiento. No comience una nueva rutina de ejercicios sin que su médico se lo indique. Si se siente cansado durante el día, está bien descansar y dormir una siesta para tener más energía.

### Sofocos

Hable con su médico si tiene sofocos. Podría recomendarle que trate de bajar su temperatura corporal, además de usar prendas holgadas de algodón. Tener encendido un ventilador y dejar las ventanas abiertas también puede servir para que el aire circule por su casa, lo cual puede ayudarle.

### Estreñimiento o disminución del apetito

Informe a su médico si tiene estreñimiento o disminución del apetito. Podría darle consejos sobre cómo controlar y hacer ajustes en su dieta. Colabore con su médico para elaborar un plan de alimentación que comprenda las cantidades adecuadas de nutrientes y líquidos que su organismo necesita. Eso incluye los alimentos que debe consumir y los que debe evitar.

Por favor, vea la sección Efectos secundarios graves en las páginas 29 y 30 y la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31. Haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa](#) de XTANDI.



# RECOMENDACIONES QUE PUEDEN AYUDARLE A MANEJAR LOS EFECTOS SECUNDARIOS (continuación)

## Diarrea

Si tiene diarrea, infórmeselo de inmediato a su médico. Es posible que su médico le sugiera que tome un antidiarreico de venta libre para ayudarlo, pero también es importante que se mantenga hidratado. Podría ser recomendable que tome bebidas deportivas, agua y caldos.

## Presión arterial alta

Es posible que el médico le examine, le haga preguntas sobre sus antecedentes médicos y sus síntomas y escuche sus latidos cardíacos. Es posible que le recomiende hacer ciertos cambios de hábitos, por ejemplo, en cuanto a la dieta y el ejercicio. El médico también podría recomendarle ciertos medicamentos para reducir la presión arterial.

## Problemas de sangrado

XTANDI puede aumentar el riesgo de sangrado. Si tiene síntomas de sangrado, asegúrese de mencionárselo al médico. Si sospecha que tiene sangrado interno o si presenta sangrado externo que no cesa, busque atención médica de inmediato.

## Caídas y fracturas óseas

Si sufre una caída, infórmeselo de inmediato al médico. Es posible que el médico necesite hacer ajustes en su plan de tratamiento. Es posible que su equipo de atención médica le recomiende tomar medidas para que su entorno sea más seguro y para reducir el riesgo de caídas. Podrían sugerirle que utilice dispositivos de asistencia y haga ejercicios para mejorar su seguridad y equilibrio. Además, usar calzado que le ofrezca soporte puede ayudarlo a tener estabilidad y reducir la probabilidad de que sufra una caída.

## Dolor de cabeza

Si presenta dolores de cabeza persistentes, infórmeselo de inmediato a su médico para que pueda evaluar la causa y determinar las medidas más adecuadas para aliviar su dolor. Aunque su médico podría recomendarle un medicamento específico para aliviar el dolor, las actividades que reducen los niveles de estrés, dormir lo suficiente, mantenerse hidratado y reducir su consumo de cafeína son medidas que pueden ayudarlo a prevenir dolores de cabeza.

XTANDI puede generar problemas de fertilidad en los hombres y esto puede afectar la capacidad de engendrar hijos.

Hable con su médico si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XTANDI. Para obtener más información, hable con su médico o farmacéutico.

**Llame a su médico para que le asesore sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o ingresando a [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).**

Por favor, vea la sección Efectos secundarios graves en las páginas 29 y 30 y la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31. Haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa](#) de XTANDI.



# MANTENER UNA COMUNICACIÓN ABIERTA

## Recomendaciones para ayudar a mejorar la comunicación

Tener una buena comunicación implica más que contarle al equipo de atención médica cómo se siente. Significa tener conversaciones abiertas y sinceras. Las siguientes recomendaciones pueden brindarle un punto de partida.

### Comunicarse con su equipo de atención médica

- Haga una lista de preguntas e inquietudes antes de asistir a la cita e incluya comentarios sobre cómo se siente
- Tome notas (o pida a su cuidador que lo haga) cuando el médico le dé instrucciones o le comunique información importante
- Siempre asegúrese de comprender lo que el médico o enfermero le diga. Puede ser útil que les repita, en sus propias palabras, lo que le dijeron
- Luego de cada cita, revise las notas y concéntrese en lo que le resulte más importante de lo que haya hablado con el médico o enfermero



*Euvon, un paciente de XTANDI, y su esposa, Janet*

Visite [XTANDI.com](https://www.xtandi.com) para ver a Euvon compartir su experiencia y conocer cómo otros pacientes que usan XTANDI viven con cáncer de próstata avanzado.

### Vaya a todas las citas acompañado de un amigo o familiar:

- Ellos pueden ayudarle a recordar lo que el médico o enfermero le dice
- También es posible que puedan ayudar a proporcionarle más información al médico o enfermero sobre su estado general

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# MANTENER UNA COMUNICACIÓN ABIERTA (continuación)

## Hablar con su familia y amigos

Su familia y amigos son quienes más se preocupan por su bienestar. Pero no siempre es fácil ser completamente abierto o sincero sobre lo que uno siente.

### Le damos algunas recomendaciones para que pueda hablar con su familia y amigos:

- Tómese el tiempo para hablar con ellos sobre lo que está pensando
- Practique lo que quiere decir
- Encuentre un momento en el que ambos estén dispuestos a hablar
- Luego, piense en otras conversaciones que le gustaría tener en el futuro

## Ponerse en contacto con otros pacientes

Los grupos de apoyo pueden ser una buena manera de compartir sus experiencias y escuchar las de otros hombres. Hablar y escuchar a otros hombres puede ayudarle a sentirse apoyado y a estar motivado. También puede ayudarle a sentirse más cómodo al abrirse para hablar sobre sus sentimientos. Visite [XTANDI.com](http://XTANDI.com) para obtener más información.



**No tema de hacer preguntas. Recuerde que su equipo de atención médica está aquí para apoyarle.** Haga una lista antes de cada cita para recordar lo que quiere preguntar o decir. Además, en [XTANDI.com](http://XTANDI.com) puede encontrar una útil Guía para conversar con el médico.



# INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

---

- ¿Qué es XTANDI?
- Información Importante de Seguridad
- Posibles efectos secundarios

# INDICACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## ¿Qué es XTANDI?

XTANDI es un medicamento recetado que se usa para tratar a los hombres con un cáncer de próstata que:

- ya no responde a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona
- se ha diseminado a otras partes del cuerpo y responde a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona
- no se ha diseminado a otras partes del cuerpo y responde a la terapia hormonal o al tratamiento quirúrgico para reducir la testosterona, y quienes corren un riesgo elevado de que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo

Se desconoce si XTANDI es seguro y eficaz para su uso en mujeres o niños.

## ¿QUÉ DEBERÍA DECIRLE A MI MÉDICO ANTES DE TOMAR XTANDI?

**Informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:**



**Tiene antecedentes de convulsiones, daño cerebral, accidente cerebrovascular o tumores cerebrales.**



**Tiene antecedentes de cardiopatía, presión arterial alta o niveles anormales de grasa o colesterol en sangre (dislipidemia).**

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)



## **Si está embarazada o tiene previsto quedar embarazada.**

XTANDI puede dañar a su bebé nonato y provocar la pérdida del embarazo (aborto).



## **Su pareja está embarazada o planea quedar embarazada.**

- Los hombres que estén en pareja con una persona que puede quedar embarazada deben usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con XTANDI y durante los 3 meses posteriores a la última dosis.
- Los hombres deben usar preservativo al mantener relaciones sexuales con una mujer embarazada.



## **Está amamantando o planea amamantar.**

Se desconoce si XTANDI pasa a la leche materna.



## **Toma otros medicamentos.**

XTANDI puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos y los otros medicamentos pueden afectar la forma en que funciona XTANDI. Esto incluye medicamentos, vitaminas y suplementos a base de hierbas, recetados y de venta libre. No comience ni deje de tomar ningún medicamento sin consultarle a su médico.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

## ¿CÓMO DEBERÍA TOMAR XTANDI?



### **Tome XTANDI exactamente como se lo indique su médico.**

Tome su dosis recetada una vez al día, todos los días a la misma hora. XTANDI puede tomarse con o sin alimentos. Ingiera las cápsulas o comprimidos de XTANDI enteros. No mastique, disuelva, ni abra las cápsulas. No corte, triture, ni mastique los comprimidos. Si es necesario, su médico puede modificar la dosis.



No cambie ni deje de tomar su dosis recetada de XTANDI sin hablar con su médico primero.



Si está recibiendo una terapia de hormonas liberadoras de gonadotropina (GnRH), debería continuar con el tratamiento mientras tome XTANDI, a menos que se haya sometido a una cirugía para reducir la testosterona en su cuerpo (castración quirúrgica).

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)



## **Si se olvida una dosis de XTANDI:**

Tome la dosis recetada tan pronto como lo recuerde ese día. Si se olvida de tomar su dosis diaria, tome la dosis recetada al día siguiente a la hora de siempre. No tome dosis mayores a la dosis diaria recetada de XTANDI.

## **Si toma demasiado XTANDI:**

Llame a su médico o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato. El riesgo de tener una convulsión puede aumentar si toma demasiado XTANDI.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

## ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE XTANDI?

**XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos:**



### **Convulsión**

Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de sufrir una convulsión. Evite actividades en las que una pérdida de conciencia repentina pueda provocar daños graves a usted o a terceros. Informe a su médico de inmediato si pierde la conciencia o tiene una convulsión.



### **Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES)**

Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de contraer una enfermedad que afecta al cerebro llamada PRES. Informe a su médico de inmediato si tiene una convulsión o síntomas que empeoran con rapidez como dolor de cabeza, disminución del estado de alerta, confusión, visión reducida, visión borrosa u otros problemas visuales. Su médico le hará una prueba para comprobar si tiene PRES.



### **Reacciones alérgicas**

Algunas personas que toman XTANDI tuvieron reacciones alérgicas. Deje de tomar XTANDI y busque atención médica de inmediato si presenta inflamación en la cara, la lengua, los labios o la garganta.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)



## Enfermedad cardíaca

Hubo casos de obstrucción de las arterias del corazón (cardiopatía isquémica) que provocaron la muerte de algunas personas durante el tratamiento con XTANDI. Su médico le monitoreará para ver si tiene signos y síntomas de problemas cardíacos durante el tratamiento. Llame a su médico o vaya a la sala de emergencias de inmediato si siente dolor de pecho o malestar en estado de reposo o al realizar actividad física, o si siente una dificultad respiratoria durante el tratamiento con XTANDI.



## Caídas y fracturas óseas

El tratamiento con XTANDI puede aumentar el riesgo de caídas y fracturas óseas. Las caídas no fueron provocadas por pérdida de la conciencia ni convulsiones. Su médico monitoreará su riesgo de caídas y fracturas óseas durante el tratamiento con XTANDI.

**Su médico detendrá el tratamiento con XTANDI si presenta efectos secundarios graves.**

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

## ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE XTANDI?



### Los efectos secundarios más comunes de XTANDI incluyen:

- Dolor muscular y articular
- Mayor sensación de cansancio que la habitual
- Sofocos
- Estreñimiento
- Disminución del apetito
- Diarrea
- Presión arterial alta
- Problemas de sangrado
- Caídas
- Fracturas óseas
- Dolor de cabeza

XTANDI puede generar problemas de fertilidad en los hombres y esto puede afectar la capacidad de engendrar hijos. Hable con su médico si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XTANDI. Para obtener más información, hable con su médico o farmacéutico.

**Llame a su médico para que le asesore sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o ingresando a [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).**



# APOYO PARA XTANDI

---

- [Cómo obtener XTANDI](#)
- [XTANDI Support Solutions®](#)
- [Preguntas para su próxima cita](#)

# CÓMO OBTENER XTANDI

## Hay 2 formas de obtener XTANDI

Es importante que sepa que XTANDI no está disponible en su farmacia local.

### 1 Farmacia especializada

En la mayoría de los casos, su médico enviará su receta de XTANDI a una farmacia especializada. La farmacia especializada surte medicamentos recetados que no puede conseguir en su farmacia habitual.

Una ventaja de obtener XTANDI en una farmacia especializada es que el medicamento se le enviará a domicilio. La farmacia especializada le llamará para programar el envío del medicamento.

### 2 La farmacia del consultorio de su médico

A veces, los consultorios médicos tienen su propia farmacia. En ese caso, le pueden surtir la receta de XTANDI.




**XTANDI Support Solutions® ayuda a los pacientes que reúnen los requisitos a encontrar formas de pagar por el tratamiento de XTANDI**

**Nuestros dedicados especialistas en acceso están aquí para ayudarle. Llame al 1-855-8XTANDI (1-855-898-2634).**

# CÓMO OBTENER XTANDI (continuación)

## Obtener XTANDI en una farmacia especializada

A continuación, le explicamos cómo funciona el proceso y le damos algunas recomendaciones para que le resulte lo más sencillo posible.



**En el consultorio del médico:** Un miembro de su equipo de atención médica completará los formularios del seguro con usted. Luego, enviará su receta a una farmacia especializada o a XTANDI Support Solutions® para ayudarle con el proceso.

**Unos días después de su cita:** La farmacia especializada le llamará para informarle los costos a su cargo y programar el envío del medicamento. Si hay algún problema con sus formularios del seguro, es posible que reciba una llamada de XTANDI Support Solutions.


### Recomendación

**En la cita, compruebe que los formularios estén completos y correctos.**

### Recomendación

**Comuníquese con su médico si no recibe noticias de la farmacia especializada en unos días.**

# CÓMO OBTENER XTANDI (continuación)



**A la hora del envío:** XTANDI puede enviarse directamente a su domicilio.

**Cuando sea momento de resurtir la receta:** La farmacia especializada le llamará para coordinar el resurtido.

## Recomendación

Si no recibió el medicamento, llame al médico o a la farmacia especializada.

## Recomendación

Si no recibe noticias de la farmacia especializada, comuníquese 2 semanas antes de que se le termine el medicamento.



**XTANDI Support Solutions® ayuda a los pacientes que reúnen los requisitos a encontrar formas de pagar por el tratamiento de XTANDI**

**Nuestros dedicados especialistas en acceso están aquí para ayudarle. Llame al **1-855-8XTANDI** (1-855-898-2634).**



XTANDI Support Solutions® le ofrece ayuda según sus necesidades particulares, incluida la ayuda para que los pacientes que reúnen los requisitos obtengan XTANDI de acuerdo con su cobertura del seguro. Llámenos hoy mismo para obtener asistencia personalizada al **1-855-8XTANDI (1-855-898-2634)**. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., ET.



## Ayuda para obtener XTANDI

Nuestros dedicados especialistas en acceso trabajarán de cerca con usted y su equipo de atención médica para ayudar a que el proceso de distribución en la farmacia especializada sea lo más sencillo posible.

### Podemos ayudarle a:

- Verificar que su equipo de atención médica tenga la documentación necesaria para enviarla a su compañía de seguros
- Coordinar el envío de XTANDI con una farmacia especializada para que pueda comenzar a tomar el medicamento lo antes posible

# XTANDI SUPPORT SOLUTIONS® (continuación)

## Ayuda para pagar XTANDI

Llame a XTANDI Support Solutions® al **1-855-8XTANDI (1-855-898-2634)** para hablar con uno de nuestros dedicados especialistas, quien podrá ver si usted reúne los requisitos para participar en programas que puedan ayudarle a cubrir el costo de XTANDI (enzalutamida).

### Si tiene un seguro comercial:

Pague tan solo

**\$0 al mes**

por su receta  
de XTANDI\*

El Programa de Ahorro para Pacientes de XTANDI\* permite que los pacientes con seguro comercial de recetas que reúnen los requisitos **paguen tan solo \$0 por receta.**

Inscríbase en [ActivateTheCard.com/XTANDISavings](https://ActivateTheCard.com/XTANDISavings).

### Si tiene Parte D de Medicare:

Podemos brindarle información de otros recursos que estén disponibles para ayudarle.†

### Si no tiene seguro:

El Programa de Asistencia para el Paciente de Astellas les brinda XTANDI sin cargo a los pacientes que reúnen los requisitos del programa.\* Todos los pacientes del programa que califiquen reciben su receta de XTANDI sin cargo.

\*Al inscribirse en el Programa de Ahorro para Pacientes de XTANDI ("Programa"), confirma que actualmente reúne los requisitos de elegibilidad y que cumplirá los siguientes términos y condiciones: El Programa es para pacientes con seguro comercial de recetas para XTANDI que reúnen los requisitos. El Programa no es válido para pacientes a quienes algún programa del gobierno estatal o federal les reintegre las reclamaciones de recetas, ya sea parcial o totalmente. Se incluyen, entre otros, los programas de Medicaid, Medicare, Medigap, el Departamento de Defensa (DoD), Asuntos de Veteranos (VA), TRICARE, el Seguro del Gobierno de Puerto Rico y cualquier otro programa estatal de asistencia farmacéutica o al paciente. Los pacientes que se transfieran de un seguro comercial a un seguro de salud federal o estatal dejarán de ser admisibles y aceptan notificar al Programa por cualquier modificación de esa índole. Los pacientes acuerdan que no solicitarán reintegros de ningún seguro de salud ni de ningún tercero por todo o parte del beneficio recibido por el paciente a través del Programa. Esta oferta no está condicionada a ninguna compra pasada, presente o futura de XTANDI. Esta oferta no es transferible y no puede combinarse con ninguna otra oferta, prueba gratuita, tarjeta de ahorro para recetas o descuento. Esta oferta no es un seguro de salud y solo es válida para pacientes que residan en alguno de los 50 estados de los Estados Unidos, Washington D. C., Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes. Esta oferta no es válida para pacientes que abonen en efectivo. Este Programa es nulo donde lo prohíba la ley. No hay cuotas para afiliados. Es ilegal vender, comprar, comerciar, falsificar, duplicar o reproducir, así como ofrecer vender, comprar, comerciar, falsificar, duplicar o reproducir la tarjeta. Esta oferta se aceptará solo en las farmacias adheridas. Se aplican ciertas reglas y restricciones. Astellas se reserva el derecho de revocar, rescindir o modificar esta oferta sin previo aviso. El Programa de Ahorro para Pacientes de XTANDI tiene un límite máximo de asistencia para copagos de \$7,000 por año natural.

†XTANDI Support Solutions® no tiene ningún tipo de influencia en las decisiones que tomen terceros independientes y tampoco garantiza su apoyo.

\*Sujeto al cumplimiento de los requisitos. Es nulo donde lo prohíba la ley.

**Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en las páginas 25-31 y haga clic aquí para acceder a la [Información para el Paciente](#) y a la [Información de Prescripción Completa de XTANDI](#).**

 **Xtandi**  
(enzalutamide)  
40 mg tablets | 80 mg tablets

# PREGUNTAS PARA SU PRÓXIMA CITA



Su salud es un trabajo en equipo. Usted y su médico toman decisiones sobre su plan de salud. Estas son algunas preguntas importantes que puede hacerle a su médico.

## ¿Puede XTANDI ayudar a los pacientes a:

- Vivir más?
- Retrasar la progresión o diseminación del cáncer?
- Disminuir las probabilidades de tener que comenzar un nuevo esquema de quimioterapia?

---

## ¿Cuál es el momento adecuado para comenzar el tratamiento con XTANDI?

- ¿Tiene algún beneficio comenzar el tratamiento con XTANDI ahora?

---

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XTANDI?

---

## ¿Mi seguro cubre el costo de XTANDI?

- ¿Puedo obtener asistencia para el pago de XTANDI?

---

## ¿Cómo debo tomar XTANDI? ¿Con cuánta frecuencia debo tomar XTANDI?

- ¿Debo tomar XTANDI con alimentos?

---

## ¿Qué tan exhaustivos han sido los estudios, las evaluaciones y el uso de XTANDI en pacientes?

---



**Para consultar información sobre los recursos que pueden ayudarle a obtener XTANDI,  
llame a XTANDI Support Solutions® al 1-855-8XTANDI.**



XTANDI, Astellas y el logo de la estrella fugaz son marcas registradas de Astellas Pharma Inc.  
XTANDI Support Solutions®, componente de Astellas Pharma Support Solutions<sup>SM</sup>, es una  
marca registrada de Astellas Pharma US, Inc.

© 2024 Astellas Pharma US, Inc. y Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. MAT-US-XTD-2024-01367 11/24

